

**VI. ULUSAL
KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ
KONGRESİ**

**Program
ve
ÖZET KİTABI**

**Düzenleyen
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği**

**10 - 14 Eylül 1995
Belek - Antalya**

REKTAL MALİGN TÜMÖRLERİN ON YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZİ

Dr. Müfide Nuran AKÇAY, Dr. M. İlhan YILDIRGAN,
Dr. M. Yavuz ÇAPAN, Dr. Cafer POLAT,
Dr. Fehmi ÇELEBİ, Dr. S. Selçuk ATAMANALP,
Dr. Durkaya ÖREN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

1985 -1995 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen 86 rektal malign tümörlü hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 50.2 (15-18 yaş), erkek/kadın oranı 62/24 idi. En sık görülen şikayet rektal kanama (% 59.1) olup, bunu karın ağrısı (%53.5), defekasyon güçlüğü (%36.6), kilo kaybı (%43.6), kabızlık (%25.3) ve ishal (%12.6) izlemekte idi. Hastaların 18'i (%20.8) acil, 68'i (%79.2) ise elektif şartlarda ameliyat edilmişti. Otuzsekiz (% 44.2) hasta nonrezektabl olarak değerlendirildi ve bunların tümüne kolostomi yapıldı. Rezektabl olarak değerlendirilen 45 (% 52.3) hastanın 15'ine abdominoperineal rezeksiyon, 13'üne low - anterior rezeksiyon, 17'sine anterior rezeksiyon uygulandı. Üç olguda (%3.5) anal kanalda yerleşen 3 cm'den küçük tümöral kitle koterle eksize edildi. Tümöral kitlelerin 53'ü (%61.6) rektumda, 30'u (%34.8) rektosigmoid kavşakta ve 3'ü (%3.6) anal kanalda yerleşmişti. Çeşitli diferansiyasyon derecelerindeki adeno kanser insidansı %95.3 olup, 1 olguda (%1.16) malign melanom, 2 olguda (%2.3) yassı hücreli kanser ve 1 olguda (% 1.16) histiyositik lenfoma tesbit edildi. Dukes evreleme sistemine göre hastaların %46.5'i D, % 43.0'ı C ve % 10.5'i B evresinde idi. Postoperatif morbiditemiz % 33.8, mortalitemiz % 5.6 idi. Mortalitenin tamamını, morbiditenin ise %80'ini acil şartlarda ameliyat edilen hastalar oluşturdu.