

**VI. ULUSAL
KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ
KONGRESİ**

**Program
ve
ÖZET KİTABI**

**Düzenleyen
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği**

**10 - 14 Eylül 1995
Belek - Antalya**

KOLOSTOMİ KAPATMALARININ MORBİDİTE ve MORTALİTE YÖNÜNDEN RETROSPEKTİF ANALİZİ (10 YILLIK)

Dr. Müfide Nuran AKÇAY, Dr. K Yalçın POLAT,
Dr. M Yavuz ÇAPAN, Dr. Fehmi ÇELEBİ,
Dr. Murat POLAT, Dr. Durkaya ÖREN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

1985-1995 yılları arasındaki 10 yıllık sürede kliniğimizde kolostomisi kapatılan 64 hasta, morbidite ve mortalite yönünden retrospektif olarak incelendi. Kolostomi kapatmalarının 38'i Hartmann, 12'si loop, 5'i divine, 5'i tek uçlu transvers ve 4'ü Mikulicz tipi kolostomi için yapılmıştı. Postoperatif dönemde görülen en sık komplikasyon yara yeri enfeksiyonu (%39) olup, toplam morbidite oranı % 43.75, mortalite oranı ise % 1.5 idi. Bir (% 1.56) hastada anastomoz yerinde obstrüksiyon gelişti. Bu hasta 3 aylık bir süreden önce kolostomisi kapatılan bir hasta idi. Yaş, cins, anastomoz tekniği, dikiş materyali, kolostominin yeri ve tipi, kapatma tekniği, kolon temizliğinin tipi morbidite ve mortaliteyi etkilemeyen faktörlerdi. Sadece operasyon süresi açısından loop kolostominin diğer tip kolostomi kapatmalarına üstünlüğü olduğu görüldü. Kolostomi yapılışı ile kapatılması arasında en az 3 aylık bir süre olması gerektiği sonucuna varıldı.