



2009 YILI
MAYIS
AYI
KONFERANSI

PROGRAM

2. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

Poster No: 28

	ADI, SOYADI	ÇALIŞTIĞI KURUM
1-	Dr.Müfide Nuran AKÇAY	Atatürk Üniversitesi
2-	Dr.M.İlhan YILDIRGAN	Tıp Fakültesi
3-	Dr.M.Yavuz ÇAPAN	Genel Cerrahi
4-	Dr.Durkaya ÖREN	Anabilim Dalı

MEME KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ (10 YILLIK)

1985-1995 yılları arasında 10 yıllık sürede kliniğimizde tedavi edilen 176 meme kanserli hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların hepsi kadın olup yaş ortalaması 44.12 yıl idi. En sık başvuru şikayeti ağrılı kitle (%62.5) olup bunu ağrısız kitle (%31.8), meme başı akıntısı (%19.3), meme başı retraksiyonu (%9.0), kızarıklık (%5.1) ve ülser yara (%3.4) izlemekteydi. Tümörler sol memede %54, sağ memede %46 oranında ve en sıklıkla (%38.6) üst-dış kadranda yerleşim göstermekte idi. Teşhis açık biopsi, ince iğne aspirasyon biopsisi, ultrasonografi ve mammografi ile konuldu. Oral kontraseptif kullanımı (%28.5), doğurmama (%14.2), emzirmeme (%14.2) ve ailede meme kanseri olması (%7.1) en sık predispozan faktörlerdi. TNM'ye göre hastaların %50'sinin Evre II'de, %34'ünün Evre III'de %10.2'sinin Evre IV'de ve ancak %5.6'sının Evre I'de teşhis edildiği görüldü. Cerrahi müdahale olarak en sıklıkla uygulanan (%78.9) modifiye radikal mastektomi idi. Oniki (%6.8) hasta inoperabl olarak kabul edildi ve bunlara kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulandı. Evre III'e dahil olan 15 hastaya preoperatif dönemde kemoterapi uygulandıktan sonra modifiye radikal mastektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucunda en sıklıkla (%90.9) tesbit edilen duktal karsinoma idi. Postoperatif komplikasyon oranı %11.9 olup, en sık (%6.8) görülen yara yeri enfeksiyonu idi. Olgularımızda mortaliteye rastlamadık.